

כיצד מתחילים סוליקווה? **SULIQUA** insulin glargine (100 U/mL) & lixisenatide

SULIQUA 100/33 - טווח צעדי מנה 30-60



מטופל המקבל אינסולין
בזאלי 30 יחידות ומעלה

30
צעדי מנה

SULIQUA 100/50 - טווח צעדי מנה 10-40



מטופל המקבל אינסולין
בזאלי 20-29 יחידות

מטופל נאיבי
(מקבל טיפול פומי)

20
צעדי מנה

10
צעדי מנה



**יש להזריק סוליקווה פעם ביום - במהלך השעה שלפני הארוחה
עדיף לפני אותה הארוחה בכל יום**

מינון סוליקווה מותאם לפי רמות הסוכר בצום

יש לעיין בעלון לרופא המעודכן כפי שאושר/עודכן בהתאם להוראות משה"ב

Suliqua is indicated in combination with metformin for the treatment of adults with type 2 diabetes mellitus to improve glycaemic control when this has not been provided by metformin alone or metformin combined with another oral glucose lowering medicinal product or with basal insulin

תרופת השילוב היחידה לחולי סכרת סוג 2 שמגיעה בשני עטים בשני יחסים שונים המאפשרים גמישות בבחירת הטיפול



מטופל המתאים לטוג'או

מטופל שאינו מאוזן עם טיפול פומי ו/או אינסולין שונה

אינו עומד בקריטריונים לקבלת GLP-1

Toujeo



מטופל המתאים לסוליקווה

מטופל שאינו מאוזן עם טיפול פומי ו/או אינסולין

עומד בקריטריונים לקבלת GLP-1

SULIQUA



קריטריונים בסל הבריאות ל-GLP-1

התרופה תינתן לחולי סוכרת סוג 2 העונים על * :

וגם

א. BMI ≥ 28 ו- HbA1c $> 7.5\%$

או

ב. BMI = 25-30 ו- HbA1c = 7.5-9%

החולים באחד מהבאים- PVD, מחלת לב כלילית, מחלה סרברוסקולרית, מחלת כליה כרונית

* לא סבלו בעבר מפנקראטיטיס, אינם סובלים מאי ספיקה כלייתית

שירותי הדרכה על עטי ההזרקה של חברת סאנופי ישראל בע"מ 1-800-300-900



1. Suliqua SPC dated 11.20 2. Toujeo SPC dated 10.20 3. Israeli NHB 2021

MAT-IL-2100266